

De Schapendoes Club

NIEUWSBRIEF 38:

9^{de} jaargang

4^{de} kwartaal 07-12-2018

De volgende punten komen aan bod:

1. Van de voorzitter
2. Van de bestuurstafel
3. Gezondheid: Jeuk en allergie
4. Gezondheidsuitslagen

1. Van de voorzitter:

We zijn alweer eind 2018 en onze vereniging bestaat alweer bijna 10 jaar. Als bestuur en leden mogen we dik tevreden zijn, geen onvertogen woord, geen oeverloze en zinloze discussies over wat dan ook, we zijn voor en met elkaar een fijne club.

SAMEN is het sleutelwoord en dat gaat tot dusver prima. We hopen dat we dit volgend jaar op de zelfde voet kunnen voort zetten.

Als voorzitter wens ik iedereen, ook namens de rest van het bestuur, fijne kerstdagen en een goed en veilig uiteinde en een geweldig Nieuwjaar.

Janny Wierda-Gorter
Voorzitter

2. Van de bestuurstafel:

Beoordelingsdag te Hoenderloo

De afgelopen jaren zijn er beduidend minder pups geboren dan de jaren daarvoor, dat bleek ook op de beoordelingsdag 2018 i.p.v. van het gebruikelijke aantal van zo'n 100 inschrijvingen zaten we op iets meer dan 50 inschrijvingen. Dit is een aantal wat 1 keurmeester gemakkelijk aan kan, dit is dan ook de reden dat we voor de beoordelingsdag 15 mei 2019 1 keurmeester hebben uitgenodigd n.l. Jettie Alberts. De keuring begint zoals gebruikelijk om 10.00 en na de keuring houden we de ALV. Op deze keuring zijn de aspirant keurmeesters van harte welkom.

Schapendoes Treffen Hoenderloo

Het Schapendoes Treffen 2018 was een kleinschalige bijeenkomst, reuze gezellig, maar er waren jammer genoeg maar weinig deelnemers. Dit heeft ons als bestuur aan het brainstormen gezet om het op een andere manier aan te pakken, ook al omdat de organisatie, ondanks diverse oproepen, steeds alleen op Dirk en Dorien Heermeyer neer komt. En Oene Rozendal kwam met een prima voorstel om hulp van buiten in te schakelen.

Het volgende Treffen is op 8 sept 2019 in Hoenderloo.
We willen, omdat de Schapendoesclub dan 10 jaar bestaat, er een extra Schapendoesfeest van maken.

De organisatie geven we uit handen aan Marloes Schijf van KynoService, zij biedt een compleet programma aan zodat we allemaal als leden aan alle activiteiten deel kunnen nemen.

Er zullen op deze dag uiteenlopende activiteiten gaan plaats vinden:

Workshops: Schapendoes Fun , Schapendoes Brains.

Spelletjes: Hooper , Schapendoes rennen

Informatie: Vachtverzorging , verschillende trainingen ,voeding.

Tevens zal er een BBQ aanwezig zijn tijdens het treffen.

Zet het in de agenda, deze dag kunt u en uw Schapendoes niet missen.

Ledenadministratie

Na mijn oproepje heeft Jolanda Lanting aangeboden de ledenadministratie op zich te nemen en vanaf nu gaat zij dat verder verzorgen, het e-mail adres is j.lanting@autolanting.nl Telf. 06-06-33755733

Fokbegeleiding

Wij, Peter en Janny Wierda, gaan verhuizen, dit betekent dat onze vaste telefoonlijn 0513-677588 vervalt, we zijn vanaf nu uitsluitend te bereiken via 06-53701234 en 06-53991306 voor adviezen e.d. betreffende het fokken. E-mail adres blijft hetzelfde.

Redactie

Tot dusver geen aanmeldingen om op vaste basis samen met Janny Wierda de nieuwsbrief te verzorgen. Dit is, mede door de op handen zijnde verhuizing van de redactie, de reden dat deze nieuwsbrief niet zo uitgebreid is als gebruikelijk. Wat we zoeken is iemand die elk kwartaal een gedeelte van de nieuwsbrief voor z'n rekening neemt, b.v. een vaste rubriek of column, elk "honden" onderwerp is goed. Interessante artikelen over hondensport, gezondheid, welzijn enz.... zelf geschreven of overgenomen (met toestemming en vermelding van de auteur) alles is welkom.

Het bestuur

3. Gezondheid: Jeuk en allergie

Gelukkig komt het niet vaak voor maar vtt. horen we toch dat een schapendoes onverklaarbare jeuk heeft.

Dat onverklaarbare heeft vaak wel een verklaring maar is soms héél moeilijk te achterhalen.

Jeuk zonder huidklachten

Soms is de oorzaak eenvoudig en heeft de hond vlooiën.

Dit is over het algemeen de meest voorkomende oorzaak, maar soms heel moeilijk om te ontdekken. Ziet u zwarte vlekjes of stipjes in de vacht van de hond dan zijn het waarschijnlijk uitwerpselen van de vlo.

Een vlo kan n.l. al weer weg zijn (dood) maar de beet kan 10 dagen jeuk veroorzaken, dus als de hond zo nu en dan een vlo oploopt ziet de eigenaar geen vlooiën maar heeft de hond wel steeds jeuk.

Zelfs als de omgeving ook behandeld is, kunnen er nog vergeten plekjes in zijn omgeving zijn waar hij weer een vlo oppikt, b.v. in de auto. De levenscyclus van een vlo speelt zich vnl. op de vloer af en eitjes, larfjes en popjes kunnen overal liggen.

Ook het regelmatig in contact komen met andere dieren kan weer een vlooiënbeet opleveren, denk aan de hondenschool, het uitlaatveld en de kat. En de ene hond reageert sterk op een vlooiënbeet en de ander weer helemaal niet, dus in een huishouden met meerdere honden kunnen honden verschillend reageren.

Regelmatig preventief behandelen (ook 's winters) kan uitkomst brengen.

Vachtverzorging en voeding spelen ook een rol in de conditie van de huid en de vacht.

Te vaak of te weinig kammen/borstelen heeft invloed op de conditie van huid en haar.

Een doffe vacht, veel schilfers en te droog of te vet haar kan ook jeuk opleveren.

De kwaliteit van het voer kan daar ook de oorzaak van zijn. Probeer dan een (beter) alternatief, niet elk voer is voor elke hond het meest ideale voer, daar waar de ene hond het perfect op doet kan bij de andere hond bovengenoemde problemen geven, daarnaast is zomaar toevoegingen geven niet altijd een verbetering, een goed voer bevat alles wat de hond nodig heeft en heeft geen toevoegingen nodig.

Langharige honden kunnen zelfs jeuk krijgen van het regelmatig nat regenen, of zwemmen. Langharige honden, zoals de schapendoes, blijven altijd vrij lang nat en de huid kan daardoor geïrriteerd worden met als gevolg.... Jeuk.

Ook (te) vaak wassen met een niet geschikte shampoo kan de zuurgraad van de huid aantasten met als gevolg.... Weer jeuk.

Gebruik, indien nodig, een milde shampoo die speciaal voor honden is.

Jeuk met huidklachten veroorzaakt door parasieten

Naast vlooiën kunnen mijten, luizen en schimmels ook ondragelijke jeuk veroorzaken en dat is zelfs nog moeilijker te ontdekken, vaak moet de dierenarts een schraapsel nemen om de diagnose te kunnen stellen. En dan zie je vaak ook echt huidklachten ontstaan.

Hier onder de meest voorkomende soorten mijten

Herfstgrasmijten (*Trombicula autumnalis*)

De herfstgrasmijt is een parasiet ter grootte van een speldenknop die vooral opvalt door zijn oranje-rode kleur. Hij komt voor in endemische gebieden. Vooral in de zomer en de herfst ligt de mijt in het gras op de loer, wachtend op zijn gastheer. De parasiet ontwikkelt zich van het ei, de larve tot de nimf tot de volwassen mijt. De volwassen mijt voedt zich met plantenmateriaal, maar de larve heeft de lymfevloeistof van het gastdier nodig om te overleven. Bij honden worden de mijtlarven vooral aangetroffen op de poten tussen de tenen, op de buik en op het hoofd. De beet van de larve kan vooral bij gevoelige dieren allergische reacties veroorzaken met ernstige jeuk tot enorme huidirritaties. Deze veranderingen kunnen blijven bestaan, zelfs na eliminatie van de parasieten. De mijtlarve is herkenbaar aan zijn onmiskenbare oranje-rode kleur direct op het aangetaste gebied of onder de microscoop.

Oormijten (*Otodectes cynotis*)

Oormijten zijn zeer gespecialiseerde parasieten die het liefste het externe gehoorkanaal koloniseren en soms ook de huid rond het oor. De ontwikkeling van de eieren, larven, nimfen tot aan de volwassen mijt vindt volledig in de gehoorgang plaats. Ze voeden zich met oppervlakkige weefselvloeistoffen en dode huidcellen van de hond. Mijten worden overgedragen door direct contact met besmette dieren, meestal puppy's. Slechts af en toe worden volwassen dieren getroffen. Typisch voor een infectie met oormijt is een

sterke jeuk met ontsteking in de oren en bruinzwarte brosse afscheiding die doet denken aan koffiedik. Gedeeltelijk bewegende mijten zijn herkenbaar als ze worden verlicht in de gehoorgang. De oormijt kan betrouwbaar worden gediagnosticeerd via een uitstrijkje van de oren.

Roofmijt (Cheyletiella spp.)

Roofmijt kan bij verschillende dieren voorkomen, zowel bij honden en katten als ook bij konijnen en zelfs bij de mens. De hele ontwikkelingscyclus van de mijt vindt plaats op het dier. Alle stadia van ontwikkeling (larven, nimfen en volwassen mijten) kunnen parasiteren. De overdracht gebeurt door rechtstreeks contact met een besmet dier, maar ook via een vervuilde omgeving of vervuilde objecten, omdat volwassen mijt-vrouwtjes zelfs in de omgeving kunnen overleven. De roofmijt leeft op het huidoppervlak. Hij beweegt zich tussen het haar voort en voedt zich met weefselvloeistoffen. De mijt veroorzaakt jeuk. Hoe erg de jeuk is kan variëren. Kleine, droge schilfers zijn kenmerkend voor deze parasieten. Zelf lijken ze op deze schilfers. Meestal vind je deze schilfers op de rug van de hond. De roofmijten moeten worden gediagnosticeerd door een stukje huid te onderzoeken of met behulp van de plakstriptechniek onder de microscoop.

Schurftmijten of grafluizen (Sarkoptes scabei var. Canis)

De grafmijt is wat betreft zijn gastheer erg kieskeurig. Hij komt voornamelijk bij de hond voor maar ook op vossen en marterachtigen. De besmetting vindt plaats door contact met andere besmette dieren of indirect via de omgeving. De schurftmijten zijn uiterst besmettelijk. De waarschijnlijkheid dat een hond die in contact komt met een zieke hond niet besmet wordt is erg klein. Zoals de naam van de mijt onthult, graaft de vrouwelijke mijt een tunnel in de keratinelaag van de huid en legt daar eieren en uitwerpselen. Tijdens het graven neemt ze afgestorven huidcellen en weefselvocht als voeding op. Zowel de irritatie van de parasieten als een allergische reactie veroorzaken een pure onverzadigbare en ondraaglijke jeuk bij de honden. De eerste zichtbare tekenen zijn rode vlekken aan de buik en ellebogen. Symptomen die later voorkomen zijn de jeuk, zelf toegebrachte haarloosheid, roos en verdikking van de huid op de oren en uiteindelijk op het hele lichaam. Om vast te stellen of het om mijten gaat, kan een oppervlakkig stukje huid onderzocht worden. Omdat zelfs een zeer klein aantal mijten ernstige jeuk kan veroorzaken, is het niet altijd mogelijk om mijten te detecteren. In dit geval kan een diagnostische therapie worden uitgevoerd.

Als alle bovenstaande klachten niet verholpen zijn na een goede vlooiënbestrijding en ook andere parasitaire oorzaken zijn uitgesloten moet u verder onderzoek (laten) doen en kan het een allergie zijn.

Vlooiënallergie

Een hond kan een vlooiënallergie ontwikkelen als hij vaak met vlooiën in contact komt. Vaak zie je dan kleine rode bultjes waar hond dan weer aan gaat krabben c.q. likken wat het probleem alleen maar groter maakt.

De jeuk en kaalheid zit dan vaak vnl. op het achterste gedeelte van de rug waardoor zelfs hotspots kunnen ontstaan, kapotte en ontstoken ronde plekken die het meest aan een schaafwond doen denken.

Deze plekken ontstaan vooral aan de hals, achter de oren (door het krabben met de achterpoten) en boven de staartaanzet (door het bijten) dat zijn n.l. de plekken waar ze het gemakkelijkste bij kunnen.

Therapie voor een vlooiënallergie is een middel aanbrengen aan de buitenkant van de hond, zodat voorkomen wordt dat de vlo bijt, tabletten, suspensies of andere middelen die zich via het bloed verspreiden zijn niet geschikt aangezien een vlo dan eerst moet bijten en bloed moet zuigen voordat hij dood gaat. Gebruik dus goede druppels voor in de nek of een spray.

Voedingsallergie

Zoals mensen allergisch kunnen zijn voor gluten-of koemelkeiwitten, zo kan de hond ook allergisch reageren op onderdelen van de voeding.

Voedingsallergie komt regelmatig voor, gelukkig niet zo vaak bij de schapendoes want vaak moet een mate van aanleg aanwezig zijn en sommige rassen zijn daar gevoeliger voor dan andere.

De allergie top-3 bestaat uit rundvlees, melkproducten en ei.

Sommige honden hebben alleen maag- en darmklachten; ze braken regelmatig en hebben (wisselend) diarree. Andere honden hebben vooral last van hun huid en/of oren. Ook combinaties komen voor.

Wanneer de verschijnselen vooral aan de huid te zien zijn, lijken de klachten erg op de klachten die bij andere allergieën voorkomen. Helaas zijn er nog steeds geen betrouwbare testen op de markt die precies kunnen vertellen voor welk onderdeel van de voeding de hond allergisch is. We kunnen daar alleen achter komen door de hond een test dieet te geven.

Testdieet zelf maken.

Het resultaat van een zelfgemaakt testdieet is het meest betrouwbaar.

Het draait erom dat de hond een vleessoort eet wat hij nog nooit eerder heeft gegeten. In veel gevallen zal dat gaan om paarden-, geiten-, of struisvogelvlees. Omdat het lichaam van de hond de tijd moet hebben de reactie op het oude voer kwijt te raken, duurt een test 6-8 weken.

Let op: er mag dan echt niets extra's geven worden, dat kan de test verstoren. Het bereiden van het voer is veel werk, maar het kan ingevroren worden in dag-porties. Voor de test periode is het bijna nooit een bezwaar dat het geen complete voeding is. Mocht het nodig zijn om langer dan 6-8 weken door te gaan, is overleg met de dierenarts over welke toevoegingen noodzakelijk zijn wel verstandig.

Testdieet kant en klaar.

Er zijn ook kant en klare diëten bij de dierenarts te koop, waarmee een goede voedingstest uit te voeren is. Het voordeel is het gebruiksgemak en daarnaast is het een volledig voer. Het eiwit in dit dieet is behandeld en zodanig klein gemaakt dat het immuunsysteem het niet meer als eiwit herkent en er dus ook niet op zal reageren. Ook deze test duurt 6-8 weken.

De uitslag

Er is altijd een uitslag. De hond reageert niet op het testdieet en heeft dan dus waarschijnlijk geen voedingsallergie. Of de hond reageert wel op de test en heeft dus hoogstwaarschijnlijk wel een voedingsallergie.

Eigenlijk moet de test dan bevestigd worden door het oorspronkelijke voer weer aan de hond te geven. Als dan de oude klachten terug komen EN weer verdwijnen met het testdieet is de voedingsallergie bewezen.

Wanneer het duidelijk is dat de hond een voedingsallergie heeft moet er gezocht worden naar een voer waar de hond wel tegen kan.

Er zijn diverse hypoallergene hondenvoeders verkrijgbaar die na het testdieet gegeven kunnen worden.

Belangrijke volgorde

Omdat een voedingsallergie niet uit een huidtest of bloedonderzoek naar voren komt en de allergie zo gemist kan worden, doen we de voedingstest voordat de huidtest en bloedonderzoek plaats vinden. De kans op een voedingsallergie is echter kleiner dan de kans op atopie.

De Atopie

Deze allergie wordt veroorzaakt door stoffen die zich in de omgeving bevinden van de hond, zoals huismijtstof, gras- en boompollen of huidschilfers van andere huisdieren. Dit is over het algemeen een erfelijke aandoening die zich openbaart vanaf de leeftijd van ong. 6 maanden.

De allergie veroorzakende deeltjes kunnen het lichaam binnenkomen via de huid en/of luchtwegen. Een hond met atopie heeft voornamelijk problemen op de kop, oren, oksels, liezen en poten (m.n. de voetjes). Soms is een (chronisch) oorprobleem het enige wat mis is. Let wel, de uitwendige gehoorgang is een onderdeel van de huid en kan dus net als de rest van de huid allergisch reageren.

Verder zien we regelmatig bindvliesontstekingen van beide ogen (traanogen, omstoken ogen) die met veel jeuk en wrijven gepaard gaan.

Het is in beide gevallen raadzaam niet alleen de oren of ogen te behandelen, maar verder te zoeken naar een onderliggende oorzaak van de allergie.

Bloed- en huidtest

Wanneer parasieten, de vlooiën- en voedselallergie zijn uitgesloten, is het tijd voor een bloed- en huistest.

In het bloed wordt gezocht naar afweerstoffen die de hond tegen verschillende stoffen heeft aangemaakt.

Voor de huidtest wordt een stukje huid kaal geschoren en worden er met kleine injecties verschillende stoffen in de huid geprikt, na zo'n 15 tot 20 minuten kunnen de reacties op die stoffen worden gemeten aan de grootte van de zwelling.

De combinatie van de deze beide testen levert uiteindelijk het meest nauwkeurige antwoord op de vraag waarvoor de hond allergisch is.

Soms is de oplossing simpel en kan de oorzaak (b.v. parkiet of cavia) uit de omgeving van de hond verwijderd worden.

Maar vaak ligt het niet zo eenvoudig. Als bekend is waar de hond op reageert, kan er van deze stof(fen) een soort inenting worden gemaakt, immunotherapie of hyposensibilisatie genoemd.

Met deze injecties, die thuis gegeven kunnen worden, wordt het immuunsysteem van de hond beïnvloed zodat hij niet meer met jeuk zal reageren op de allergieverwekkende stoffen.

In ongeveer 70% van alle gevallen zullen de klachten van de hond afnemen of zelfs helemaal verdwijnen. Het resultaat laat zich niet altijd meteen zien, soms duurt het maanden voordat er werkelijk verschil merkbaar is.

In de meeste gevallen zullen deze injecties een leven lang gegeven moet worden.

Bijkomende infecties

Door het vele krabben, bijten en likken, schuren de haren weg en gaat de beschermende huidlaag kapot. In de bek van de hond – en ook op de huid zelf – leven veel bacteriën.

Die horen daar en doen normaal geen kwaad, maar als de huid beschadigd is, kunnen deze bacteriën (en ook gisten) binnendringen en daar ontstekingen veroorzaken met als gevolg nog meer jeuk.

Dit betekent dat er niet alleen aan de oorzaak gewerkt moet worden maar ook aan de bijkomende infecties. Het kan betekenen dat de hond regelmatig een antibioticum of een anti-gist kuur voorgeschreven krijgt en dat de hond regelmatig met dermatologische shampoos gewassen moet worden. Dit zal sowieso de jeukklachten al helpen verminderen.

Medicijnen

Wanneer het niet lukt om de oorzaak van de allergie te vinden of goed te behandelen, kunnen er ook medicijnen gegeven worden om de meest ernstige klachten te verminderen.

Corticosteroïden: diverse vormen van prednison. Dit zijn ontstekingsremmende middelen die bijwerkingen hebben en vereisen een zeer zorgvuldig gebruik en regelmatige controle van de dierenarts. Een voorzichtig gebruik van deze middelen kan een (erg) goed resultaat geven.

Cyclosporine: ook een krachtige ontstekingsremmer, het heeft net als prednison een goed resultaat maar zonder bijwerkingen. Helaas is dit medicijn is, m.n. voor grote honden, erg duur.

Antihistaminica: een minder sterke ontstekingsremmer, waar sommige honden toch erg goed op reageren. Het grote voordeel is dat er minder bijwerkingen aan toegeschreven worden.

Dermatologische shampoos:

Deze verminderen de allergene stoffen in de vacht, bestrijden bacteriën en verminderen schilfers. Ze hebben daardoor een jeukremmend effect en ondersteunen de behandeling. De toepassing is wekelijks.

Omega-3 en-6 verzuren

Het ontstekingsremmend effect van deze verzuren op de zieke huid is inmiddels aangetoond. Het is geen geneesmiddel maar kan wel een belangrijke aanvulling zijn op het verminderen van de ontstekingsreactie op de huid.

Gelukkig komt Atopie maar zelden voor bij de schapendoes, maar het is wel een allergie waar de hond levenslang last van heeft. In een enkel geval geneest de hond. Meestal lukt het alleen om het probleem onder controle te krijgen met een gecombineerde aanpak van immunotherapie, antibiotica, ontstekingsremmers, diëten en shampoos. Een goed behandelplan in samenwerking met de dierenarts is hierbij essentieel.

Overige allergieën

De hond kan ook reageren op stoffen waar de huid mee in aanraking komt. B.V. nikkel in een halsband of wasmiddelen waarmee de hondendecken worden gewassen. Ook schoonmaakmiddelen en vloerlakken kunnen voor een allergische reactie zorgen. Af en toe zien we ook een reactie op een vlooiendek (druppels of banden) vaak zijn de reacties van de huid dan heel lokaal en is de link eenvoudig te leggen en is het vermijden van deze stoffen de oplossing. Daarnaast kan de hond ook reageren op planten en op andere insecten dan de vlo.

Met dank aan Dierenartsenkliniek Bornego

4. Gezondheidsuitslagen: 01-07-2018 t/m 31-10-2018

ROFFEL OBER V. T STRUTJE
TOTEM TOEPOEL V. SNUFFEL-KNUFFEL
AMAI YULA V.D. REGGEDOES

HD A
RD niet vrij
CD niet vrij

Wilt u ook een leuk stukje voor de nieuwsbrief schrijven of deel uitmaken van de redactie? Er zijn steeds meer mensen die regelmatig een stukje aanleveren en dat is alleen maar erg positief. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter en wordt door de leden erg op prijs gesteld.

Mail uw bijdrage naar J.W.G. info@schapendoes.net

De volgende nieuwsbrief komt in febr. uit, dus kopij aanleveren voor 31-01-19

Oproep !

Hierbij doet de club een oproep aan de leden, die in de vakanties op een schapendoes willen passen. De bedoeling hiervan is, wanneer er over en weer op een does gepast gaat worden, dat met gesloten beurzen gaat.

Een voorwaarde is dat u wel lid bent van de Schapendoes Club. U kunt zich opgeven bij: E.Jetten e-mail: secretaris@schapendoesclub.nl of telf.06-25174781

Algemene informatie

Het bestuur van "de Schapendoes Club"

Voorzitter:

J.Wierda-Gorter voorzitter@schapendoesclub.nl 06-53991306

Vicevoorzitter:

D.Heermeyer schapendoes@kpnmail.nl 0313-652971

Secretaris:

E.Jetten secretaris@schapendoesclub.nl 06-25174781

Penningmeester:

O.Rozendal penningmeester@schapendoesclub.nl 0527-292268

Algemeen bestuurslid

P.A.J.Wierda info@schapendoes.net 06-53701234

Regio contacten

Friesland:

Marije Kroes mamskroes@hetnet.nl 0561-420508

Drenthe/Groningen:

Miriam Scheffer deoldegrise@kpnmail.nl 06-23103247

Overijssel:

Tanja Rozendal tanja.rozendal@planet.nl 0527-292268

Flevoland:

Betsy Dommerholt betsy.dommerholt@gmail.com 036-5223212

Veluwe:

Dirk en Dorien Heermeyer schapendoes@kpnmail.nl 0313-652971

Twente:

Susan Kwekkeboom hulsboom@planet.nl 06-10290866

Betuwe:

Dick en Aleid v.Dam info@debonteboelenham.com 0488-412613

Carla v.d.Bosch boschbes@hetnet.nl 06-20915972

Limburg:

Marion Quaedvlieg marionquaedvlieg@home.nl 045-5743537

Diverse

Fokbegeleiding-database

Peter en Janny Wierda info@schapendoes.net 06-53991306

Commissie evenementen:

Dirk en Dorien Heermeyer schapendoestreffen@kpnmail.nl 0313-652971

Herplaatsing, bemiddeling nood-en vakantieopvang

Ellen Jetten secretaris@schapendoesclub.nl 06-25174781

Redactie/webmaster en design

J.W.G. info@schapendoes.net

Ledenadministratie

Jolanda Lanting j.lanting@autolanting.nl 06-33755733

Overige

Contributie 2019:

Nieuwe leden: **eenmalig** inschrijfgeld € 5,00 alleen voor hoofdlid
Contributie hoofdlid € 16,00 per jaar Aanmelding na 1 juli € 8,00
Contributie gezinslid € 8,00 per jaar Aanmelding na 1 juli € 4,00

Te betalen voor 1 maart van het nieuwe jaar.

Machtiging automatische incasso is opvraagbaar bij de penningmeester.

Fokkersvermelding € 10,- per jaar

Na minimaal 6 maanden lidmaatschap recht op gratis nestvermelding(en), maximaal 14 weken per nest.

Dekreuenvermelding voor NIET leden 17,50 per jaar, voor leden gratis.

Regio Bank Oudehaske t.n.v "de Schapendoes Club"
IBAN nr. NL50 RBRB 0920 7031 51 BIC RBRBNL21